

# Chraňte sebe i svoji rodinu

Vybrané možnosti očkování v rámci **povinného a nepovinného** očkovacího kalendáře **pro děti do 1 roku.**



	POVINNÁ OČKOVÁNÍ	NEPOVINNÁ HRAZENÁ OČKOVÁNÍ	NEPOVINNÁ NEHRAZENÁ OČKOVÁNÍ
6 TÝDNŮ			<b>Rotarix</b> <b>Rotaviry</b> 1. dávka vakcíny Rotarix podávaná ústy od 6 týdnů věku
9. TÝDEN	 <b>HEXAVAKCÍNA</b> 1. dávka	 <b>BEXSERO</b> <b>Meningokok B</b> 1. dávka vakcíny Bexsero plně hrazená ZP+	
3 MĚSÍCE		 <b>Synflorix</b> <b>Pneumokok**</b> 1. dávka vakcíny Synflorix plně hrazena ZP*	<b>Rotarix</b> <b>Rotaviry</b> 2. dávka vakcíny Rotarix podávaná ústy, do 24. týdnů věku. Min. odstup mezi dávkami jsou 4 týdny
4 MĚSÍCE	 <b>HEXAVAKCÍNA</b> 2. dávka	 <b>BEXSERO</b> <b>Meningokok B</b> 2. dávka vakcíny Bexsero plně hrazená ZP+	
5 MĚSÍCŮ		 <b>Synflorix</b> <b>Pneumokok**</b> 2. dávka vakcíny Synflorix plně hrazena ZP*	
11.-13. MĚSÍC	 <b>HEXAVAKCÍNA</b> Přeočkování		
12-15 MĚSÍCŮ		 <b>Synflorix</b> Pneumokok** Přeočkování vakcínou Synflorix plně hrazeno ZP*	 <b>BEXSERO</b> Meningokok B Přeočkování vakcínou Bexsero plně hrazeno ZP+

Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných osob.

+Vakcína Bexsero je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do konce 12. měsíce věku dítěte nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku.

\*Vakcína Synflorix je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

\*\*Pro předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) se doporučuje aplikace 3 dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování 1 dávkou ve schématu 3+1.

Vakcíny Bexsero, Infanrix Hexa, Synflorix a Rotarix jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Vakcíny Bexsero, Infanrix Hexa a Synflorix se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Vakcína Rotarix se podává ústy. O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na [www.gskkompendium.cz](http://www.gskkompendium.cz). Případné nežádoucí účinky, prosím, nahláste na [cz.safety@gsk.com](mailto:cz.safety@gsk.com). Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici,